

**+18 Exam**  
great growth


پروژه تضمینی مثبت ۱۸

پکیج تضمینی نمره +۱۸ در امتحانات خرداد

اینجا کلیک کن

## با اسمه تعالی

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سؤالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۷		


ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) اگر باقی مانده تقسیم $f(x) = x^5 + kx - 1$ بر $(x+1)$ برابر با ۲ باشد، مقدار $k$ برابر ..... است. ب) دوره تناوب تابع تانژانت برابر با ..... است. پ) مشتق تابع $f(x) = \sqrt{2x-1}$ در نقطه ای به طول یک روی منحنی تابع، عدد ..... است. ت) اگر تابع $f(x) = y$ در بازه $[a, b]$ صعودی باشد، علامت مشتق تابع $f$ در این بازه ..... است.	۱
۱/۵	نمودار تابع $f$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = -f(2x)$ را رسم کنید. سپس دامنه و برد تابع $g$ را تعیین کنید. 	۲
۱	هر یک از چند جمله ای های زیر را بر حسب عامل خواسته شده، تجزیه کنید. الف) $x^5 + x^4$ با عامل $x+1$ ب) $-x^6$ با عامل $x-1$	۳
۰/۷۵	نمودار تابع $f(x) = (x+1)^n$ را رسم کنید. این تابع در دامنه خود اکیداً صعودی است یا اکیداً نزولی؟	۴
۰/۵	درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید. الف) مینیمم تابع $y = -3\cos(\pi x) + 2$ برابر با یک است. ب) تابع تانژانت در دامنه اش صعودی است.	۵
۱	ضابطه تابعی به فرم $y = a \sin bx + c$ را بنویسید که دوره تناوب آن $\pi$ ، مقدار ماکریزم آن ۳ و مقدار مینیمم آن -۳ باشد.	۶
۱/۲۵	معادله مثلثاتی $\cos 3x - \cos x = 0$ را حل کنید.	۷
۱/۵	حدود زیر را به دست آورید. الف) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+1}{4-x}$ ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5 + 3x^3 + 1}{-3x^5 + 3x^3 + 3}$	۸
۱/۵	مجانب های قائم و افقی تابع $f(x) = \frac{3x}{x^3 - 1}$ را بیابید.	۹
۱	مشتق پذیری تابع $f(x) =  x-2 $ را در $x=2$ بررسی کنید.	۱۰

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

## با اسمه تعالی

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳	مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۷		
http://ace.medu.ir			

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	سره
۱۱	با در نظر گرفتن نمودار $f$ در شکل، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) طول نقطه‌ای که معاس در آن افقی است. ب) طول نقطه‌ای که مشتق در آن مقداری منفی است. پ) طول نقطه‌ای که تابع در آن مشتق پذیر نیست.	۰/۷۵
۱۲	اگر $f$ و $g$ توابع مشتق پذیر باشند و $g(2) = 3$ , $f'(2) = 1$ , $f(2) = -3$ , $g'(2) = 2$ و $(fg)'(2) = 12$ باشد آورید.	۱/۲۵
۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.) $y = \frac{x^3 + 1}{x^3 + 2x - 5}$ (الف) $y = \cos^3(-3x + 1)$ (ب)	۲
۱۴	یک توده باکتری پس از $t$ ساعت دارای جرم $m(t) = \sqrt{t + t^2}$ گرم است. آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه $t = 9$ چقدر است؟	۰/۷۵
۱۵	ضرایب $a$ و $b$ را در تابع $f(x) = -x^4 + ax^2 + b$ طوری تعیین کنید که در نقطه $(1, 2)$ ماقزیمم نسبی داشته باشد.	۱/۵
۱۶	جهت تقری و نقطه عطف نمودار تابع $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ را به دست آورید.	۱
۱۷	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ رارسم کنید.	۱/۷۵
۲۰	جمع نمره	موفق و سربلند باشید.



با اسمه تعالی

ردیف	راهنمای تصحیح	مرمه
۱	الف) $-2 < x < 2$ (تمرین ۲ صفحه ۲۲) ب) $\pi$ (تمرین ۶ صفحه ۲۲) نکته صفحه ۳۳ ت) مثبت (۰/۲۵) (قضیه صفحه ۱۲۱) پ) ۱ (۰/۲۵) (تمرین ۶ صفحه ۸۲)	۱۳۹۷/۱۰/۰۳
۲	$D_g = [-1, 2] \quad (0/5)$ $R_g = [-2, 1] \quad (0/5)$ 	۱۳۹۷
۳	الف) $x^5 + 1 = (x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1) \quad (0/5)$ ب) $x^6 - 1 = (x-1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \quad (0/5)$ (مشابه تمرین ۸ صفحه ۲۲)	۱
۴	اکیداً سعودی (۰/۲۵) 	۰/۷۵
۵	الف) نادرست (۰/۰) (نکته صفحه ۲۷) ب) درست (۰/۰) (تمرین ۵ صفحه ۳۴)	۰/۵
۶	$\frac{2\pi}{ b } = \pi \Rightarrow  b  = 2 \quad (0/25)$ $\begin{cases}  a  + c = 3 \\ - a  + c = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases}  a  = 3 \\ c = 0 \end{cases} \quad (0/25)$ (تمرین ۳ صفحه ۳۴) هر یک از سه تابع $y = 3 \sin(2x)$ یا $y = -3 \sin(2x)$ یا $y = 3 \sin(-2x)$ نصره داده شود.	۱
۷	$\cos 3x = \cos x \quad (0/25) \Rightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + x \quad (0/25) \Rightarrow x = k\pi \quad (0/25) \\ 3x = 2k\pi - x \quad (0/25) \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} \quad (0/25) \end{cases}$ (مشابه مثال صفحه ۳۹)	۱/۲۵
۸	الف) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+1}{4-x^2} = -\infty \quad (0/5)$ ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5}{-3x^6} \quad (0/5) = -\frac{4}{3} \quad (0/5)$ (تمرین ۳ صفحه ۶۹)	۱/۵
۹	مجانب قائم $x^2 - 1 = 0 \quad (0/25) \Rightarrow x = 1 \quad (0/25)$ مجانب افقی $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x^2 - 1} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x^2} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0 \quad (0/25) \Rightarrow y = 0 \quad (0/25)$ (مشابه سوال ۲ کار در کلاس صفحه ۶۸)	۱/۵

«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»

پاسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۴۰۷		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره												
۱۰	مشتق پذیر نیست. (۰/۲۵) زیرا: $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ x-2  - 0}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x-2} = 1 \quad (0/25), \quad f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1 \quad (0/25)$	۱												
۱۱	(مشابه تمرین ۴ صفحه ۸۱) (الف) $a$ (۰/۲۵) (ب) $b$ (۰/۲۵) (پ) $c$ (۰/۲۵) (پ) $d$ (۰/۲۵)	۰/۷۵												
۱۲	(کار در کلاس صفحه ۹۵) $(fg)'(2) = \underbrace{f'(2)g(2)}_{(0/25)} + \underbrace{f(2)g'(2)}_{(0/25)} = 1 \times (-3) + 3 \times 2 = 3 \quad (0/25)$ $(f+g)'(2) = \underbrace{f'(2)}_{(0/25)} + \underbrace{g'(2)}_{(0/25)} = 3 \quad (0/25)$	۱/۲۵												
۱۳	(محاسبه تابع مشتق از صفحه ۹۲ تا صفحه ۹۶) (الف) $y' = \frac{(0/25)2x(x^3 + 2x - 5) - (x^3 + 1)(3x^2 + 2)}{(x^3 + 2x - 5)^2} \quad (0/25)$ (ب) $y' = \underbrace{-3 \times 2}_{(0/25)} \underbrace{\cos(-3x + 1)}_{(0/25)} \underbrace{(-\sin(-3x + 1))}_{(0/25)}$	۲												
۱۴	(مشابه تمرین ۸ صفحه ۱۱۰) $m'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 2t \quad (0/5) \rightarrow m'(9) = \frac{109}{6} \quad (0/25)$	۰/۷۵												
۱۵	(مشابه تمرین ۷ صفحه ۱۲۶) $f'(x) = -4x^3 + a \quad (0/25) \xrightarrow{f'(0)=0} -4 + a = 0 \quad (0/25) \Rightarrow a = 4 \quad (0/25)$ $f(1) = 2 \quad (0/25) \Rightarrow -1 + 4 + b = 2 \quad (0/25) \Rightarrow b = -1 \quad (0/25)$	۱/۵												
۱۶	(تمرین ۲ صفحه ۱۳۶) $f'(x) = -3x^2 + 6x \quad (0/25), \quad f''(x) = -6x + 6 = 0 \quad (0/25) \rightarrow x = 1$ <table border="1"><tr><td>x</td><td>-∞</td><td>1</td><td>+∞</td></tr><tr><td>y''</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>y</td><td>↑</td><td>۳</td><td>↓</td></tr></table> (۰/۲۵) نقطه عطف (۰/۲۵) (۱, ۳)	x	-∞	1	+∞	y''	+	0	-	y	↑	۳	↓	۱
x	-∞	1	+∞											
y''	+	0	-											
y	↑	۳	↓											
۱۷	$x = 2 \quad (0/25)$ م.قائم $y = 1 \quad (0/25)$ م.افقی $y' = \frac{-3}{(x-2)^2} \quad (0/25)$ <table border="1"><tr><td>x</td><td>-∞</td><td>2</td><td>+∞</td></tr><tr><td>y'</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>y</td><td>1 ↴ ∞ ↑ ∞ ↓</td><td></td><td></td></tr></table> (۰/۵) (تمرین ۱ صفحه ۱۴۴)	x	-∞	2	+∞	y'	-	-	-	y	1 ↴ ∞ ↑ ∞ ↓			۱/۷۵
x	-∞	2	+∞											
y'	-	-	-											
y	1 ↴ ∞ ↑ ∞ ↓													

" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است "