

+18 Exam
great growth

پروژه تضمینی مثبت ۱۸

پکیج تضمینی نمره +۱۸ در امتحانات خرداد

اینجا کلیک کن

بسمه تعالیٰ

ساعت شروع: 10 صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک 3
مدت امتحان: 110 دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: 3	تاریخ امتحان: 99/10/20
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99 http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
1	درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با واژه های ((درست)) یا ((نادرست)) در پاسخ نامه مشخص کنید. الف) شبی خط مماس بر نمودار مکان - زمان حرکت جسم در هر لحظه برابر سرعت لحظه ای است. ب) اگر جهت حرکت متحرک تغییر کند، حرکت متحرک شتابدار است. پ) نیروی مقاومت شاره وارد بر جسم، به تنیدی حرکت جسم بستگی ندارد. ت) ضریب اصطکاک ایستایی معمولاً از ضریب اصطکاک جنبشی کوچکتر است. ث) دوره تناوب آونگ ساده به جرم وزنه متصل به آونگ بستگی دارد. ج) تاب خوردن کودک که به طور دوره ای هل داده می شود مثالی از نوسان واداشته است.	1/5
2	متوجهی روی خط راست، فاصله بین مکان آغازین $\vec{r}(+5m)$ و مکان پایانی $\vec{r}(-5m)$ را طی می کند. الف) بردار جایه جایی این متحرک را به دست آورید. ب) در چه صورت اندازه سرعت متوسط متحرک با تنیدی متوسط حرکت متحرک برابر است؟	0/75
3	شکل زیر نمودار سرعت - زمان متحرکی را در حرکت روی محور x نشان می دهد. الف) نوع حرکت متحرک در بازه زمانی صفر تا 3s تندشونده است یا کندشونده؟ چرا؟ ب) مسافتی که متحرک در بازه زمانی صفر تا 5s می بیماید، چند متر است؟	0/25
4	معادله مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت $x = 2t^2 - t$ است. معادله سرعت - زمان این متحرک را به دست آورید.	1
5	نمودار نیروی کشسانی دو فنر A و B بر حسب تغییر طول آنها مطابق شکل زیر است. ثابت (سختی) کدام فنر بیشتر است؟ توضیح دهید.	0/5
	ادامه سوالات در صفحه دوم	

بسمه تعالیٰ

ساعت شروع: 10 صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک 3
مدت امتحان: 110 دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: 3	تاریخ امتحان: 99/10/20
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99 http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
6	<p>جسمی به وزن یک نیوتون را مانند شکل، با نیروی عمودی F به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم.</p> <p>الف) مقدار نیروی اصطکاک چقدر است؟</p> <p>ب) اگر نیروی عمودی F را افزایش دهیم، تعیین کنید با این کار اندازه هر یک نیروهای زیر؛ کاهش می یابد، افزایش می یابد یا ثابت می ماند؟</p> <p>(1) نیروی عمودی سطح (2) نیروی وزن (3) نیروی اصطکاک بیشینه (4) نیروی اصطکاک</p>	0/25
7	<p>در هر یک از گزاره های زیر، جای خالی را با واژه مناسب پر کنید.</p> <p>الف) طبق قانون نیوتون، شتاب جسم با نیروی خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد.</p> <p>ب) جهت نیروی وزن و در نتیجه شتاب گرانشی همواره به طرف است.</p> <p>پ) وزن ماهواره ای که در ارتفاع R (شعاع زمین) از سطح زمین قرار دارد برابر وزن آن روی سطح زمین است.</p> <p>ت) در نقطه تعادل حرکت هماهنگ ساده سامانه جرم - فنر، انرژی نوسانگر صفر است.</p> <p>ث) مسافتی که موج در مدت یک دوره تناوب نوسان چشمه طی می کند برابر است.</p> <p>ج) عموماً ضریب شکست یک محیط معین برای نورهایی با طول موج کوتاه تر است.</p>	1/5
8	اندازه تکانه جسمی به جرم 2kg که با سرعت ثابت 10m/s در حرکت است را حساب کنید.	0/75
9	<p>از داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) در حرکت هماهنگ ساده، دامنه نوسان؛ بیشینه فاصله نوسانگر از (نقطه تعادل - نقطه بازگشتی) است.</p> <p>ب) تندی انتشار صوت در هوا به (دامنه موج صوتی - دمای هوا) بستگی دارد.</p> <p>پ) طول موج (امواج رادیویی - نور مرئی) از طول موج امواج فروسرخ بیشتر است.</p> <p>ت) وقتی چشمه صوت به ناظر ساکن نزدیک می شود، فاصله جبهه های موج در عقب چشمه (بیشتر - کمتر) می شود.</p> <p>ث) میدان های الکتریکی و مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی همواره (عمودبر - موازی با) جهت حرکت موج هستند.</p> <p>ج) در دماهای معمولی، بیشتر تابش گسیل شده از سطح اجسام در ناحیه (فرابنفش - فروسرخ) است.</p>	1/5
10	<p>دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده $0/1\text{m}$ و دوره تناوب آن $0/4\text{s}$ است. (این نوسانگر در مبدأ زمان، در انتهای مثبت مسیر نوسان قرار دارد)</p> <p>الف) معادله مکان - زمان این نوسانگر را بنویسید.</p> <p>ب) نمودار مکان - زمان این نوسانگر را در یک دوره تناوب رسم کنید.</p>	0/5
	ادامه سوالات در صفحه سوم	

بسمه تعالیٰ

ساعت شروع: 10 صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک 3
مدت امتحان: 110 دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: 3	تاریخ امتحان: 99/10/20
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99 http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 99	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
11	در یک فاصله مشخص از یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت $\beta = 100 \text{dB}$ دریافت می شود. شدت این صدا را (بر حسب W/m^2) حساب کنید. $(I_o = 10^{-12} \text{ W/m}^2)$	0/75
12	اگر یک موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، در قسمت نازک طناب هر یک از کمیت‌های زیر در مقایسه با موج فرودی چه تغییری می‌کند؟ (بخشی از موج به قسمت ضخیم بازتاب می‌شود). الف) بسامد موج بازتابیده ب) طول موج موج بازتابیده پ) تندی موج عبوری	0/75
13	جرم یک تار تحت کشش $0/05 \text{kg}$ و طول آن 1m است. اگر تندی انتشار موج در این تار 20 m/s باشد. نیروی کشش تار چند نیوتن است؟	0/75
14	یک چشمۀ نور فوتون‌هایی با طول موج 400 nm گسیل می‌کند. انرژی هر فوتون چند ژول است? $(hc \approx 2 \times 10^{-25} \text{ J.m})$	0/75
15	تعريف کنید. الف) لختی ب) موج طولی پ) اثر فتوالکتریک	0/5 0/5 0/5
16	کوتاه‌ترین طول موج گسیلی اتم هیدروژن در رشتۀ بالمر ($n' = 2$)، چند نانومتر است؟ ($R = 0/01 \text{ (nm)}^{-1}$)	0/75
17	الف) ناکامی مدل اتمی تامسون را بنویسید. ب) فرایند گسیل الکایی را توضیح دهید. پ) فرایند واپاشی روبه‌رو را کامل کنید. (هستۀ دختر با نماد ${}^A_Z Y$ در پاسخ‌نامه نوشته شود).	0/5 0/5 0/5
18	نیمه عمر یک مادهٔ پرتوزا، حدود 10 روز است. پس از گذشت 40 روز، چه کسری از مادهٔ اولیه در نمونه‌ای از این مادهٔ پرتوزا، باقی می‌ماند؟	1/25
	شاد و پیروز باشید	

بسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰		تعداد صفحه: ۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۹		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست ص. ۹. ب) درست ص. ۱۰. ث) نادرست ص. ۴۰. پ) نادرست ص. ۳۴. هر مورد (۰/۲۵)	۱/۵
۲	الف) (۰/۲۵) ب) متحرک روی خط راست و در یک جهت حرکت کند. (۰/۲۵) $\vec{d} = \vec{d}_2 - \vec{d}_1$ (۰/۲۵) $\vec{d} = (-5m)\hat{i} - (+5m)\hat{i}$ (۰/۲۵) $\vec{d} = (-10m)\hat{i}$ (۰/۲۵)	۱
۳	الف) کندشونده (۰/۲۵) زیرا تندی متحرک در حال کاهش است. (۰/۲۵) ص. ۱۶.	۱/۵
۴	الف) $I = s_1 + s_2$ (۰/۲۵) $I = \frac{-9 \times 3}{2} + \frac{6 \times 2}{2}$ (۰/۵) $I = 19/5m$ (۰/۲۵) ب) ص. ۱۹. $a = 4m/s^2$ (۰/۲۵) $v_0 = -1 m/s$ (۰/۲۵) $v = at + v_0$ (۰/۲۵) $v = 4t - 1$ (۰/۲۵) ص. ۱۷.	۱
۵	فner B، شیب خط این نمودار برابر ثابت فner است و شیب خط B بیشتر است. (۰/۲۵) ص. ۴۱.	۰/۵
۶	الف) $f_s = mg = 1 N$ (۰/۲۵) ب) ۱- افزایش (۰/۲۵) ۲- ثابت (۰/۲۵) ۳- افزایش (۰/۲۵) ۴- ثابت (۰/۲۵) ۵- مقدار (۰/۲۵)	۱/۲۵
۷	الف) دوم ص. ۳۲. ب) زمین (مرکز زمین) ص. ۲۴. ث) طول موج ص. ۶۳. پ) پتانسیل ص. ۵۸. پ) یک چهارم ص. ۴۹. ج) بیشتر ص. ۸۷. هر مورد (۰/۲۵)	۱/۵
۸	$P = mv$ (۰/۲۵) $P = 2 \times 10 = 20 \text{ kg.m/s}$ (۰/۵) ص. ۴۵.	۰/۷۵
۹	الف) نقطه تعادل ص. ۵۵. ب) دمای هوای ص. ۶۵. ث) عمود بر ص. ۶۷. پ) بیشتر ص. ۷۵. ج) فرسخ ص. ۹۹. هر مورد (۰/۲۵)	۱/۵
۱۰	الف) (۰/۲۵) $x = A \cos \frac{2\pi}{T} t$ (۰/۲۵) $x = +1 \cos \frac{2\pi}{0.4} t$ (۰/۵) $x = +1 \cos 5\pi t$ (۰/۲۵) ب) ص. ۸۹.	۱/۵

بسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰		تعداد صفحه: ۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۹	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$ (۰/۲۵) $100 = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$ (۰/۲۵) $I = 10^{-2} W/m^2$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۲	الف) ثابت هر مورد (۰/۲۵) ب) افزایش ص. ۸۲ پ) افزایش	۰/۷۵
۱۳	$v = \sqrt{\frac{F \cdot L}{m}}$ (۰/۲۵) $20^2 = \frac{1 \times F}{0.1}$ (۰/۲۵) $F = 20 N$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۴	$E = \frac{hc}{\lambda}$ (۰/۲۵) $E = \frac{2 \times 10^{-35}}{400 \times 10^{-9}} = 5 \times 10^{-19} J$ (۰/۵)	۰/۷۵
۱۵	الف) خاصیتی از اجسام است که میل دارند وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروی خالص وارد بر آنها صفر است حفظ کنند. (۰/۵) ص. ۲۹ ب) در این موج، جایه‌جایی هر جزء نوسان کننده‌ای از فنر (یا ماده که موج در آن حرکت می‌کند) در راستای حرکت موج است. (۰/۵) ص. ۶۲ پ) وقتی نوری با بسامد مناسب به سطح فلزی بتابد الکترون‌هایی از سطح فلز گسیل می‌شوند. (۰/۵) ص. ۹۷	۱/۵
۱۶	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = 0.1 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\infty} \right)$ (۰/۲۵) $\lambda = 400 nm$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۷	الف) بسامدهای تابش شده از اتم که در این مدل پیش‌بینی شده بود با نتایج تجربی سازگار نبود. (۰/۵) ص. ۱۰۳ ب) یک فوتون ورودی، الکترون برانگیخته را تحریک (یا القا) می‌کند تا تراز انرژی خود را تغییر دهد و به تراز پایین‌تر برود. (۰/۵) ص. ۱۱۰ پ) $Y = 232^{90} Y$ (۰/۵) ص. ۱۱۷	۱/۵
۱۸	$n = \frac{t}{T_{\frac{1}{2}}}$ (۰/۲۵) $n = \frac{40}{10} = 4$ (۰/۲۵) $N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
	$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^4$ (۰/۲۵) $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{16}$ (۰/۲۵)	ص. ۱۲۱
۲۰	همکاران محترم، ضمن عرض خسته نباشید لطفاً برای پاسخ‌های صحیح دیگر، نمره لازم را در نظر بگیرید.	