

+18 Exam
great growth

پروژه تضمینی مثبت ۱۸

پکیج تضمینی نمره +۱۸ در امتحانات خرداد

اینجا کلیک کن

با سمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح	رشته : علوم تجربی	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۸/۱۰	مدت امتحان: ۱۲۰
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوبت دی ماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)			ردیف
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.	۰/۷۵
۱	الف) تابع $y = \sqrt{2}x^3 - \frac{3}{4}x$ یک چندجمله ای از درجه ۳ است. ب) اگر $f(7) = 5$ و $g(4) = 7$ ، آنگاه $(fog)(4) = 5$. ج) دو تابع $f(x) = -\frac{2x+7}{6}$ و $g(x) = -\frac{7}{2}x - 3$ وارون یکدیگرند.	
۲	درجاهای خالی عبارت ریاضی مناسب را انتخاب کنید. الف) نمودار تابع $f(x) = x^3$ در بازه $(0, 1)$ ، از نمودار تابع $g(x) = x^3$ قرار دارد.(بالاتر - پایین تر) ب) چند جمله ای $p(x) = 2x^3 + x^2 + 1$ بخش پذیر است.(($x+1$), ($x-1$)).	۰/۵
۳	الف) با توجه به نمودار توابع f و g ، مقادیر زیر را در صورت وجود به دست آورید. ۱) $(gof)(-1)$ ۲) $(g^{-1}of^{-1})(2)$ ب) نمودار تابع $f(x-2)$ رارسم کنید.	۱
۴	نمودار زیر بوابی تابعی با ضابطه $f(x) = a \cos bx + c$ است. با دقیق شکل نمودار و تشخیص دوره تناوب و مقادیر مکزیمم و مینیمم تابع، ضابطه آن را مشخص کنید.	۱/۵
۵	معادله مثلثاتی $\cos 2x - \sin x + 1 = 1$ را حل کنید.	۱/۵
۶	حد تابع زیر را در صورت وجود محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^3 - x}{4x^2 - 1}$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{\sin^2 x}$	۱/۷۵
۷	مشتق پذیری تابع مقابل را در نقطه $x = -1$ بررسی کنید.	۱/۵
« ادامه سوالات در صفحه دوم »		

با سمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	ساعت شروع: ۱۰: صبح	رشته : علوم تجربی	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۸/۱۰	مدت امتحان: ۱۲۰
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوبت دی ماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)			ردیف
نمره			

۸	مشتق تابع های زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) الف) $f(x) = (x^3 + 2x - 1)^5$	$(\sqrt{3x+2})(x^3 - 1)$ () () () ()
۹	اگر توابع f, g مشتق پذیر باشند و $3f + 2g$ مقادیر $f'(1) = 5, g'(1) = 3$ را به دست آورید.	
۱۰	معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t) = t^3 - t + 10$ بر حسب متر در بازه $[0, 5]$ (بر حسب ثانیه) داده شده است. در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه زمانی $[0, 5]$ با هم برابرند؟	
۱۱	اکسترمم‌های مطلق تابع $x^3 - 12x - 2x^3 + 3x^5$ را در بازه $[-1, 3]$ مشخص کنید.	
۱۲	اگر نقطه $(2, 1)$ نقطه اکسترمم نسبی تابع $f(x) = x^3 + bx^5 + d$ باشد، مقادیر b, d را به دست آورید.	
۱۳	خروج از مرکز یک بیضی افقی $\frac{4}{5}$ ، مرکز آن $(-4, -1)$ و طول قطر کوچک این بیضی ۶ واحد است. الف) فاصله کانونی را محاسبه کنید. ب) مختصات نقاط دو سر قطر بزرگ این بیضی را پیدا کنید.	
۱۴	معادله دایره‌ای بنویسید که مرکز آن $(3, 0)$ و بر خط $3x - 4y = 3$ مماس باشد.	
۱۵	۴ ظرف یکسان داریم. در ظرف اول ۱۴ مهره قرار دارد شامل ۴ مهره‌ی قرمز است. در ظرف دوم همه مهره‌ها قرمزند و ظرف سوم ۸ مهره دارد که شامل ۶ مهره‌ی قرمز است. در ظرف چهارم هیچ مهره قرمزی وجود ندارد. با چشم بسته یکی از ظرفها را انتخاب کرده و از آن یک مهره بیرون می‌آوریم. احتمال آن که مهره انتخابی قرمز باشد چقدر است؟	
۲۰	جمع نمره "موفق باشید"	

با اسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی ۳ ریاضی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۸		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوتب دی ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست صفحات: ۲ و ۲۲ و ۲۹ ج) نادرست هر مورد ۰/۲۵	۰/۷۵
۲	الف) پایین تر صفحات: ۴ و ۵۰ ب) $(x + 1)^0/25$	۰/۵
۳	الف) ۱) $(gof)(-1) = g(1) = -5 \quad (0/5)$ ۲) $(g^{-1}of^{-1})(2) = g^{-1}(4) = -4 \quad (0/5)$ ب) رسم درست نمودار یک نمره صفحات: ۲۳ و ۲۹	۱
۴	$ a = \frac{2 - (-2)}{2} = 2 \quad a = -2 \quad (0/5)$ $ b = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \quad b = 1 \quad (0/5) \quad f(x) = -2 \cos x \quad (0/25)$ $c = \frac{2 + (-2)}{2} = 0 \quad (0/25)$ صفحه: ۴۰	۱/۵
۵	$\overbrace{2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0}^{(0/25)} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \quad (0/25) \\ \sin x = \frac{1}{2} \quad (0/25) \end{cases} \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \quad (0/25)$ $x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (0/25)$ $x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \quad (0/25)$ صفحه: ۴۸	۱/۵
۶	الف) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x)(2x-1)}{(2x+1)(2x-1)} \quad (0/5) \quad = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x)}{(2x+1)} = \frac{1}{4} \quad (0/25)$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{\underbrace{\sin^2 x}_{(0/5)}} = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (0/25)$ صفحات: ۵۳ و ۵۷	۱/۷۵

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی ۳ ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۸		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	تابع در $x = 1$ پیوسته است. (۰ / ۲۵) $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 3 - 4}{x - (-1)} = -2$ (۰ / ۵) $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x + 6 - 4}{x - (-1)} = 2$ (۰ / ۵) $f'_+(1) \neq f'_-(1)$ (۰ / ۲۵) ۹۱ $f'(-1)$ موجود نیست. صفحه: ۹۱	۱/۵
۸	$f'(x) = 5(x^3 + 2x - 1)^4(2x + 2)$ (۰ / ۷۵) $g'(x) = (\underbrace{\frac{3}{2\sqrt{3x+2}}}_{(0/5)})(\underbrace{3x+2}_{(0/5)}) + (\underbrace{\sqrt{3x+2}}_{(0/5)})(\underbrace{2}_{(0/5)})$ صفحه: ۹۲	۰/۷۵
۹	$\overbrace{3f'(1) + 2g'(1)}^{(0/25)} = \overbrace{9+10}^{(0/25)} = 19$ (۰ / ۲۵) صفحه: ۹۲	۰/۷۵
۱۰	$\Rightarrow \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0}$ (۰ / ۲۵) = ۴ (۰ / ۲۵) $f'(t) = 2t - 1 = 4$ (۰ / ۲۵) $t = \frac{5}{2}$ (۰ / ۲۵) صفحه: ۱۰۰	۱
۱۱	$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 0$ (۰ / ۲۵) $\begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \notin [-1, 3] \end{cases}$ (۰ / ۵) $f(-1) = 13$ (۰ / ۲۵) $f(1) = -7$ (۰ / ۲۵) $\Rightarrow \min(1, -7)$ (۰ / ۲۵) $f(3) = 45$ (۰ / ۲۵) $\Rightarrow \max(3, 45)$ (۰ / ۲۵) صفحه: ۱۱۱	۲
۱۲	$f(2) = 1 \Rightarrow 4b + d = -7$ (۰ / ۵) $f'(2) = 0 \Rightarrow b = -3, d = 5$ (۰ / ۵) صفحه: ۱۱۲	۱
۱۳	(الف) $a = \frac{5}{4}c \Rightarrow \frac{25}{16}c^2 = 9 + c^2$ $FF' = 2c = 8 \Rightarrow (0/75)$ (ب) $a = 5$ (۰ / ۲۵) $\Rightarrow A(1, -1), A(-9, -1)$ (۰ / ۵) صفحه: ۱۳۲	۱/۵

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی ۳ ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۸		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوتب دی ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	$r = \frac{ 3x - 4 \times 3 - 3 }{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3 \quad (0/5) \quad \Rightarrow (x-3)^2 + (y-3)^2 = 9 \quad (0/5)$ صفحه: ۱۳۹	۱
۱۵	$P(A) = P(B_1)P(A B_1) + P(B_2)P(A B_2) + P(B_3)P(A B_3) + P(B_4)P(A B_4) \quad (0/25)$ $P(A) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{14} + \frac{1}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times \frac{6}{8} + \frac{1}{4} \times 0 = \frac{57}{112} \quad (0/25)$ در صورت حل به روش درختی نمره تعلق گیرد. صفحه: ۱۴۷	۱/۵
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	۲۰